

ブリィビアクト錠 25mg

ブリィビアクト錠 50mg

【この薬は？】

販売名	ブリィビアクト錠 25mg BRIVIACT Tablets	ブリィビアクト錠 50mg BRIVIACT Tablets
一般名	ブリーバラセタム Brivaracetam	
含有量 (1錠中)	25mg	50mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師又は薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、抗てんかん剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、脳内の神経の過剰な興奮をはずめて、てんかん発作を抑えます。
- ・次の目的で処方されます。

てんかん患者の部分発作（二次性全般化発作を含む）

- ・この薬は、体調が良くなったと自己判断し、服用を中止したり、量を加減したりすると、病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

過去にブリイビアクト錠に含まれる成分やピロリドン誘導体（ピラセタム（ミオカーム内服液）、レベチラセタム（イーケプラ錠/ドライシロップ/点滴静注等））に対し過敏な反応を経験したことがある人

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・肝臓に障害のある人
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人
- ・授乳中の人

○この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

- ・使用量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、飲む量と回数は次のとおりです。

販売名	ブリイビアクト錠 25mg	ブリイビアクト錠 50mg
1日量	50mg～200mg	
飲む回数	1日2回	

- ・1日の最大使用量は200mgです。

●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。気がついた時に、1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分飲んでください。

●多く使用した場合（過量使用時）の対応

傾眠（刺激がないと眠ってしまう）、浮動性めまい（宙に浮いた感じ、ふらつき）の症状があらわれる可能性があります。いくつかの症状が同じような時期にあらわれた場合は、使用を中止し、ただちに医師に連絡してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬を連用中に薬の量を急激に減らしたり、中止したりすると、てんかん発作が悪化したり、てんかん重積状態（てんかん発作をくりかえし、なかなか回復しない状態）があらわれたりすることがあります。自分の判断で減量したり、中止したりせずに、医師の指示どおりに飲んでください。
- ・傾眠、めまいなどがおこることがあるので、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作は行わないようにしてください。
- ・患者さんや家族の方は、この薬の使用で、攻撃的になる、激越（落ち着きがない、感情が激しくたかぶった状態）、精神病性障害（幻覚、妄想、興奮、抑うつ）、易刺激性（ちょっとした刺激で気持ちや体の変調を来すこと）などの症状があらわれ、自殺をするために実際に行動をおこす可能性があることについて、医師から十分に理解できるまで説明を受けてください。
- ・患者さんは、この薬の使用で、攻撃的になる、自殺をするために実際に行動をおこすなどの症状があらわれた場合、医師に相談してください。また、家族の方は、患者さんの状態の変化について観察し、変化がみられた場合には、医師に連絡してください。患者さんご自身も気分に変化があったと感じた場合には、家族の方にも伝えるようにしてください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・アルコールを含む飲食物はこの薬に影響しますので、控えてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでい

副作用は？





特にご注意ください重大な副作用と、主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
攻撃性 こうげきせい	いらいら感、興奮、不安

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
頭部	いらいら感、興奮、不安

【この薬の形は？】

販売名	ブリビアクト錠25mg	ブリビアクト錠50mg
PTP シート	 <p>表面</p>  <p>裏面</p>	 <p>表面</p>  <p>裏面</p>
形状	フィルムコート錠	フィルムコート錠
長径、短径	長径：8.9mm、短径：5.0mm	長径：11.7mm、短径：6.6mm
厚さ	3.4mm	4.0mm
重さ	142mg	281mg
色	灰色	黄色
識別コード	u25	u50

【この薬に含まれているのは？】

販売名	ブリービアクト錠25mg	ブリービアクト錠50mg
有効成分	ブリーバラセタム	
添加剤	乳糖水和物、無水乳糖、β-シクロデキストリン、クロスカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、タルク、酸化チタン、マクロゴール4000、黄色三二酸化鉄、黒酸化鉄	乳糖水和物、無水乳糖、β-シクロデキストリン、クロスカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、タルク、酸化チタン、マクロゴール4000、黄色三二酸化鉄、三二酸化鉄

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：ユーシービージャパン株式会社

(<https://www.ucbjapan.com/>)

ユーシービーケアーズコンタクトセンター

電話：0120-093-189

受付時間：月曜～金曜日 9:00～17:30

（土日・祝日・会社休日を除く）