

抗てんかん剤

一般名：ブリーバラセタム [Brivaracetam (JAN)]

薬価基準未収載



# ブリビアクト®

錠 25mg  
錠 50mg  
静注 25mg

発売  
準備中

処方箋医薬品 (注意—医師等の処方箋により使用すること)

BRIVIACT®

## 製造販売承認取得のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社ならびに弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、抗てんかん剤「ブリビアクト®錠25mg・50mg [一般名：ブリーバラセタム]」、及び「ブリビアクト®静注25mg」につきまして、製造販売承認を取得いたしましたので、ここに謹んでご案内申し上げます。

ブリビアクト®は、日本を含むアジア地域で実施された2つの臨床第Ⅲ相試験 (EP0083試験及びEP0085試験) にて有効性と安全性が評価された新たな抗てんかん剤です。

弊社では、これまで抗てんかん剤としてイーケプラ®、ビムパット®を販売してまいりましたが、てんかん治療に新たな治療選択肢を提供することで、てんかんとともに生きる患者さん、ご家族に貢献できるよう、これからも邁進いたします。

なお、販売開始の時期等につきましては、改めてご案内いたします。

今後とも一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

令和6年6月吉日

### ● 効能又は効果

〈錠〉 てんかん患者の部分発作 (二次性全般化発作を含む)

〈静注〉 一時的に経口投与ができない患者における、下記の治療に対するブリーバラセタム経口製剤の代替療法  
てんかん患者の部分発作 (二次性全般化発作を含む)

### ● 用法及び用量

〈錠〉 通常、成人にはブリーバラセタムとして1日50mgを1日2回に分けて経口投与する。なお、症状により1日200mgを超えない範囲で適宜増減できる。

〈静注〉 ブリーバラセタムの経口投与から本剤に切り替える場合：

通常、ブリーバラセタム経口投与と同じ1日用量及び投与回数にて、1回量を2分から15分かけて静脈内投与する。

ブリーバラセタムの経口投与に先立ち本剤を投与する場合：

通常、成人にはブリーバラセタムとして1日50mgを1日2回に分け、1回量を2分から15分かけて静脈内投与する。

いずれの場合においても、症状により適宜増減できるが、1日最高投与量は200mgとする。

### ● 包装

〈ブリビアクト錠25mg〉 PTP：100錠 (10錠×10)、プラスチックボトル：100錠 (バラ)

〈ブリビアクト錠50mg〉 PTP：100錠 (10錠×10)、プラスチックボトル：100錠 (バラ)

〈ブリビアクト静注25mg〉 バイアル [2.5mL×6バイアル]

