

中面のシートを切り離して、
患者さんへお渡しください。

ビムパット ドライシロップを服用される 患者さんにご家族の方へ



監修

聖マリアンナ医科大学 小児科 名誉教授

山本 仁 先生

■ ビムパット ドライシロップの服用方法

- お薬は服用時に水を加えてかき混ぜてから服用してください。

- お薬に慣れるため、少量から服用をはじめ、徐々に量を増やしていきます。

主治医の指示に従って決められた量を服用してください。

ご自身の判断でお薬の量を増やしたり、減らしたりしないでください。

(発作が長期間抑制され、脳波も正常化した場合には、お薬の量を少なくできることもあります。)



❗ 飲み忘れにご注意を 次のような工夫で飲み忘れを防ぎましょう

- 時計や携帯電話(スマートフォン)のアラームをセットする。
- 冷蔵庫など家の中の目立つ場所にメモを貼る。
- カレンダーや手帳にしるしをつけて服用状況を記録する。



Daiichi-Sankyo

第一三共株式会社



ユーシービージャパン株式会社

■ ビムパット ドライシロップ服用により、めまい、眠気、ふるえ、嘔吐などが起こることがあります。

めまい



眠気



ふるえ



嘔吐



※小さいお子様は、うまく自分の症状を説明できない場合もあります。いつもと違う様子がみられる場合は注意してください。

- 副作用があらわれてもご自身の判断でお薬の服用をやめないで、主治医や薬剤師に相談してください。

体調の変化を感じた場合や、
気になる症状があらわれた場合、服用の方法がわからない時などは
主治医や薬剤師に相談するようにしてください。



第一三共株式会社



ユーシービージャパン株式会社