

リスティーゴ®による重症筋無力症の治療を受けている方へ 出張や旅行へ行く際の注意事項

リスティーゴ®はご自宅でも外出先でも使用することができるため、出張や旅行に持っていくことができます。

まずは主治医に出張や旅行に行っても問題がないことを確認してください。自己注射に必要なものを持ち運ぶための保冷バッグもご提供しています。より詳細な情報は患者さん向け「重症筋無力症サイト MycolorinG」をご確認ください。

My colorinG



出張や旅行に行く際の確認事項

- 主治医に出張や旅行に行っても問題がないことを確認しましょう。
- 保冷バッグをご要望の方は、主治医にご相談ください。
- お薬手帳を準備しましょう。
- 旅行に必要な数のリスティーゴ®を用意しましょう。急な旅程の変更(特に飛行機利用の際)に備えて、予備のリスティーゴ®も持っていきましょう。

飛行機に乗る際は

- リスティーゴ®は温度による影響をうけるので、機内持ち込み荷物にしましょう。預け入れ荷物に入れてはいけません。
- 裏面の注射器を携行するための薬剤携行証明書を主治医に相談して用意しましょう。リスティーゴ®を機内に持ち込む際に提示することで、保安検査をよりスムーズに行うことができます。
- 保安検査場では、保安検査スタッフに薬剤携行証明書を提示し、X線検査ではなく目視検査するよう求めてください。

海外に行く際は

- 海外に行く場合、医薬品の持ち込みについてのルールは国によって異なります。渡航先により、持ち込む数量に制限がある場合や、事前に申請・特定の書類が必要な場合がありますので、通過国を含め滞在する予定の国のルールを大使館などへ事前に確認しましょう。
- 時差をとまなう移動がある場合、現地時間ではなく、最終投与からの経過時間に従って注射の時刻を決めてください。1週間に1回注射をすることが大切です。

注意事項

リスティーゴ®を持ち運ぶ際には、保冷バッグを使用してください。一度室温に戻したリスティーゴ®は、再冷蔵できません。滞在先では外箱ごと、冷蔵庫(2~8℃)に入れてください。

製品についてのお問い合わせは

UCBCares®

ユーシービーケアーズ コンタクトセンター*

TEL: 0120-093-189

受付時間 9:00~17:30(土日・祝日・会社休日を除く)

*上記コンタクトセンター電話番号は海外からはつながりませんが、「ONWARDにつながるアプリ」をお使いの方は、国内外ともにチャット経由でご連絡いただくことが可能です。

自己注射の方法は

こちらからご確認ください



ユーシービージャパン株式会社

薬剤携行証明書

Medicine & Medical Supply Certificate

薬剤変性の危険性を避けるため、できるだけX線検査ではなく目視検査をお願いいたします。

To avoid the risk of damaging the medication, please inspect this medicine visually instead of using an X-ray machine, whenever possible.

日付

Date (yyyy/mm/dd) : / /

氏名

Name

生年月日

Date of birth (yyyy/mm/dd) : / /

住所

Address

(患者氏名)は全身型重症筋無力症の治療のため、以下の薬剤を携行しています。これらは営利目的で使用しません。

(患者氏名) _____ requires the following items for treatment of their health condition, generalized myasthenia gravis. It will not be used for business or other purposes.

Please allow the patient to carry this essential medication & supplies on their person.

リスティーゴ®バイアル(ロザノリキシズマブ)

● RYSTIGGO® (rozanolixizumab-noli)

mg vials

数量

Quantity :

廃棄容器

● Containers to dispose used syringes

(↓該当する場合はチェック)シリンジポンプ

☐ Charged syringe driver

投与チューブ付き翼状針 シリンジ ツートック®(採液針) アルコール綿 コットン綿 絆創膏 固定テープ

● Butterfly needles with administration tubes, syringes, D2Mix™ (vial adapters), alcohol swabs, cotton wool balls, adhesive bandages, surgical tapes

Other drugs for generalized myasthenia gravis(その他の全身型重症筋無力症の治療の薬剤)

●

●

使用済みのリスティーゴ®バイアル、投与チューブ付き翼状針、シリンジ、ツートック®(採液針)は患者本人が持ち帰り、医療機関の指示に従って廃棄します。

All used RYSTIGGO® vials, butterfly needles with administration tubes, syringes and D2Mix™ (vial adapters) will be brought back by the patient themselves and discarded as directed by their healthcare provider.

主治医氏名

Name of Physician

病院名

Name of Clinic/Hospital

病院住所

Address of Clinic/Hospital

電話番号

Phone Number +81-

主治医署名

Physician's Signature